

# Individuelle Arbeitsanweisung

## Manuelle Reinigung und Desinfektion von ZEG-Spitzen und Ansätze der KaVo Kanüle Mehrfunktionsspritze, Acteon Airpolisher



WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Zahnarztstuhl/ Arbeitsplatz/</b>	Durch Spülen der oben genannten Instrumente	Nach Behandlungsende	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ am Instrumentenschlauch</li> <li>➤ in die Speischale</li> <li>➤ mind. 20 Sekunden durchspülen</li> </ul>	- Betriebswasser aus der Behandlungseinheit
	Entfernen der oben genannter Instrumente vom Handstück	Nach dem Durchspülen	<p>Einmalhandschuhe + Mund-Nase-Schutz + Schutzbrille tragen!</p> <p>Mit Schlüssel der Hersteller von den Instrumenten vom Handstück entfernen</p>	Geeigneter Schlüssel (Werkzeug) (lt. Herstellerangabe)
	Kontaminationsgeschützter Transport vom Behandlungsplatz zum Aufbereitungsbereich	Nach dem Entfernen	Einmalhandschuhe tragen!	Kontaminationsgeschützter Transport, z.B. geeignete Desinfektionswanne mit Deckel/geschlossenes Tray

WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Unreine Seite</b> <b>Aufbereitungsraum/</b>	Vorbehandlung	Unmittelbar nach dem kontaminationsgeschützten Transport	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen  ➤ Zerlegen der Instrumente (z.B. Schlüssel-ZEG-Spitze)  ➤ beides unter fließendem, kaltem Trinkwasser ggf. mit geeigneter Kunststoffbürste sichtbare Kontaminationen entfernen  ➤ mit Wasserpistole und Instrumentenspezifischen ALPRO-Adapter durchspülen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Greifpinzette</li> <li>• Trinkwasser</li> <li>• optimal VE-Wasser + geeignete Kunststoffbürste</li> <li>• <b>WaterJet</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• <b>Adapter</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> </ul>

WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Unreine Seite</b>  <b>Aufbereitungsraum/</b>	Außenreinigung der oben genannten Instrumente	Nach der Vorbehandlung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! Bei grober Verschmutzung an den Instrumenten und des Schlüssels mit nicht proteinfixierenden Reinigungstüchern abwischen  oder  Nicht proteinfixierende Reinigungslösung <b>WL-Clean</b> und fusselfreies Einmaltuch	z. B. <b>CleanWipes, IC-100</b> , ALPRO MEDICAL GMBH und fusselfreies Einmaltuch  oder  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WL-clean*</b> Lösung: z. B. <b>MaxiWipes reel*</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> </ul>
	Innenreinigung der oben genannten Instrumente	Nach der Außenreinigung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!  <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reinigungslösung mit Adapteraufsatz durch o. g. Instrumente 3 x 2 Sekunden sprühen und mit einem fusselfreien Tuch auffangen</li> <li>➤ ZEG-Schlüssel außen und innen benetzen</li> <li>➤ Einwirkzeit 1 Minute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WL-clean*</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• spezifischer <b>ALPRO-Adapter**</b></li> <li>• <b>MaxiWipes reel*</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!</p>
<p>*Ansetzen der trockenen Tücher mit 2,5 L <b>MinutenSpray-classic</b> oder bei <b>MaxiWipes reel</b> 1,4 L und bei <b>MaxiWipes-L reel</b> 1,6 <b>PlastiSept eco</b> ALPRO MEDICAL GMBH  <b>*Achtung:</b> bei der Anwendung Dose senkrecht halten  <b>**Achtung:</b> nur mit instrumentenspezifischen ALPRO-Adaptoren wurden die Gutachten erstellt</p>				

WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Unreine Seite</b>  <b>Aufbereitungsraum/</b>	Außendesinfektion der oben genannten Instrumente	Nach der Innenreinigung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ Desinfektionslösung <b>WL-cid</b> auf ein fusselfreies Einmaltuch sprühen und oben genannte Instrumente damit abwischen ➤ Einwirkzeit 5 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WL-cid*</b> Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH z. B. <b>MaxiWipes reel</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> </ul>
	Innendesinfektion der oben genannten Instrumente	Nach der Außendesinfektion	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen! ➤ O. g. Instrumente für 2 x 3 Sekunden in ein saugfähiges fusselfreies Tuch, z. B. <b>MaxiWipes reel</b> durchsprühen ➤ ZEG-Schlüssel außen und innen benetzen ➤ Einwirkzeit 5 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WL-cid*</b> Lösung, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• spezifischer <b>ALPRO-Adapter**</b></li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!</p>

\*Achtung: bei der Anwendung Dose senkrecht halten  
 \*\*Achtung: nur mit instrumentenspezifischen ALPRO-Adaptern wurden die Gutachten erstellt

WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Aufbereitungsraum/ Unreine Seite</b>	Innen und Außen-Trocknung und Entfernung von Rückständen in o. g. Instrumente	Nach der Innendesinfektion	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!  ➤ O. g. Instrumente (+ Adapter) mit geeigneter Druckluft in ein saugfähiges, fusselfreies Tuch durchblasen  ➤ ZEG-Schlüssel (+ Adapter) mit geeigneter Druckluft in ein saugfähiges, fusselfreies Tuch trocken blasen  ➤ Trocknung bis keine sichtbaren Rückstände mehr austreten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WL-dry*</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• <b>WL-Blow*</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• spezifischer ALPRO-<b>Adapter**</b></li> <li>• Dauer mind. 2 x 3 Sekunden</li> </ul> <p style="color: red;"><b>Hinweis:</b> Nicht auf Personen oder offene Flammen richten!</p>
	Kontrolle	Nach der Trocknung	Schutzhandschuhe, Nassschürze + Schutzbrille tragen!  Sichtkontrolle	ggf. Lupenbrille
<b>Zur behördlich geforderten Leistungsüberprüfung von Reinigungsprozessen ist eine Restproteinbestimmung zyklisch durchzuführen (OPA/BCA).</b> *Achtung: bei der Anwendung Dose senkrecht halten **Achtung: nur mit instrumentenspezifischen ALPRO-Adaptern wurden die Gutachten erstellt				

WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Aufbereitungsraum/ Reine Seite</b>	Klassifizierung	Nach der Kontrolle	Einmalhandschuhe tragen! ➤ Kritisch B	
	Verpackung der ZEG-Spitze und ZEG-Schlüssel	Vor der Dampfsterilisation	➤ ZEG-Spitze mit Schlüssel verbinden und lt. Herstellerangabe einschweißen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignete Einschweißfolie</li> <li>• Geeignetes Einschweißgerät</li> </ul>
	Dampfsterilisation	Nach der Verpackung	➤ Beladung des Dampfsterilisators nach Herstellerangabe (Helixtest)	Geeigneter Dampfsterilisator
	Kontrolle und Freigabe  Kennzeichnung	Nach der Dampfsterilisation	➤ Kontrolle auf Feuchtigkeit, Unversehrtheit der Verpackung ➤ Kontrolle Helixtest ➤ Prozessparameter ➤ Thermoindikator  ➤ Kennzeichnung: Chargennummer, Personalnummer, Ablaufdatum, Sterinummer	<b>Sichtkontrolle</b>  <b>Aufkleber oder Etikettendrucker</b>

WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Aufbereitungsraum/ Reine Seite</b>	Dokumentation	Nach der Kontrolle, Freigabe und Kennzeichnung	Dokumentation durch freigabeberechtigte Person	Sterikontrollbuch oder Netzwerkeinbindung des Sterilisators
	Lagerung	Nach der Dokumentation	Staubgeschützt, UV-beständig Lagerung im Schrank oder in der Schublade	
	Aufbereitung ALPRO-Adapter	Arbeitstäglich	Reinigung im Tauchbad oder im Ultraschall*  Zwischenspülung  Desinfektion im Tauchbad oder im Ultraschall*  Spülung  Trocknung  Alternativ: Aufbereitung im RDG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AlproZyme</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• Trinkwasser, optimal VE-Wasser</li> <li>• <b>BIB forte eco</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• Trinkwasser, optimal VE-Wasser</li> <li>• <b>WL-dry/WL-Blow</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>• Geeigneter Adapter, Hersteller RDG</li> </ul>
*hierbei sind Lufteinschlüsse durch eine aufrechte Positionierung zu vermeiden				

WO	WAS	WANN	WIE	WOMIT
<b>Aufbereitungsraum/ Reine Seite</b>	Aufbereitung der <b>WL-Blow-Pistole</b>	Arbeitstaglich	Auenreinigung und-desinfektion mit einem getrankten Tuch  <b>Hinweis:</b> Die viruzide Auendesinfektion sollte mit einem geeigneten mit <b>WL-cid</b> Losung getrankten Tuch,  z. B. <b>MaxiWipes reel</b> , ALPRO MEDICAL GMBH oder Tork-Tuch, Premium Spezial (gema VAH) erfolgen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MinutenWipes</b>, ALRPO MEDICAL GMBH,</li> <li>• <b>PlastiSept eco Wipes</b>, ALRPO MEDICAL GMBH</li> <li>• <b>MaxiWipes reel*</b>, ALRPO MEDICAL GMBH mit <b>MinutenSpray-classic</b> oder <b>PlastiSept eco</b>, ALPRO MEDICAL GMBH getrankt</li> <li>- <b>WL-cid</b> Losung z. B. <b>MaxiWipes reel</b>, ALPRO MEDICAL GMBH</li> <li>- Einwirkzeit mind. 5 Minuten</li> </ul>
* Ansetzen der trockenen Tucher mit 2,5 L <b>MinutenSpray-classic</b> oder bei <b>MaxiWipes reel</b> 1,4 L und bei <b>MaxiWipes-L reel</b> 1,6 L <b>PlastiSept eco</b> ALPRO MEDICAL GMBH				

**Unterweisung durch:**

---

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

**zur Kenntnis genommen:**

---

Datum/Unterschrift (Personal)

**Erstellt von:**

---

Datum/Unterschrift (Praxisbetreiber)

**aktualisiert am:**

---

Datum/Unterschrift (Personal)

# Dokumentation manuelle Aufbereitung

## Formblatt II

<b>Chargennummer:</b> _____	
<b>Reinigung und Desinfektion Ultraschall- und Aircalatorspitzen:</b>	
1. Sachgerechte Vorbereitung der Medizinprodukte wurde nach der aktuellen SAA durchgeführt	<input type="checkbox"/>
2. Vorspülen innen & außen nach SAA	<input type="checkbox"/>
3. Reinigung innen & außen nach SAA	<input type="checkbox"/>
4. Desinfektion innen & außen nach SAA	<input type="checkbox"/>
5. Trocknung innen nach SAA	<input type="checkbox"/>
6. Sichtkontrolle außen und Pflege innen nach SAA und Herstellerangaben	<input type="checkbox"/>
7. Weitere Aufbereitung gemäß Risikobewertung, thermische Abschlussbehandlung	<input type="checkbox"/>
<b>Arbeitsschritte vollständig durchgeführt</b>	<b>ja    nein</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Freigabe**

Datum: \_\_\_\_\_ Name/Unterschrift: \_\_\_\_\_

Sterilisation nach SAA des Herstellers des Sterilisationsgerätes gemäß DIN EN ISO 13060	<b>Durchgeführt</b>	
	<b>ja</b>	<b>nein</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Teilfreigabe von** \_\_\_\_\_ **bis** \_\_\_\_\_ **Arbeitsschritte vollständig durchgeführt**

<b>ja</b>
-----------

Datum: \_\_\_\_\_ Name/Unterschrift: \_\_\_\_\_